

# การโซนนิ่งพื้นที่เกษตรกรรมสำหรับการผสมผสานทางเลือกสำหรับการใช้ที่ดิน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

## Agricultural Zoning for Alternative Combination of Land use in Northeast Thailand

วาสนา พุฒกลาง<sup>1,2</sup>

ชรัตน์ มงคลสวัสดิ์<sup>1,2</sup>

<sup>1</sup>ศูนย์ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนา

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

<sup>2</sup>ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Wasana Putklang<sup>1,2</sup>

Charat Mongkolsawat<sup>1,2</sup>

<sup>1</sup>Geo-informatics Centre for Development of  
Northeast Thailand, Khon Kaen University

<sup>2</sup>Regional Centre for Geo-Informatics and Space  
Technology, Northeast Thailand, Khon Kaen University

### บทคัดย่อ

การประเมินที่ดินโดยทั่วไปใช้กับพืชชนิดเดียวซึ่งให้ข้อมูลที่ไม่เพียงพอสำหรับทางเลือกการผสมผสานของการใช้ที่ดิน การศึกษาครั้งนี้เพื่อประเมินความเหมาะสมของที่ดินสำหรับปลูกพืชเศรษฐกิจ ได้แก่ ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง และยางพารา ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และทำโซนนิ่งพื้นที่การเกษตรด้วยการสร้างขอบเขตหน่วยการใช้ที่ดินที่เหมาะสมสำหรับการผสมผสานทางเลือกการใช้ที่ดินโดยคำนึงถึงสภาพเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม พื้นที่ศึกษาครอบคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื้อที่ประมาณ 170,000 ตารางกิโลเมตร พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง และยางพารา การวิเคราะห์โซนนิ่งเพื่อหาความเหมาะสมของที่ดินของพืชเศรษฐกิจทั้ง 4 ชนิดเป็นไปตามหลักการประเมินที่ดินของ FAO โดยบูรณาการคุณภาพที่ดินสำหรับพืชเศรษฐกิจหลักแต่ละชนิด ได้แก่ น้ำที่เป็นประโยชน์ คุณสมบัติของดิน ศักยภาพของดินเค็ม และสภาพภูมิประเทศ สร้างเป็นชั้นข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และทำการวิเคราะห์แบบซ้อนทับสร้างแบบจำลองแบบผลคูณ เพื่อให้ได้ความเหมาะสมของที่ดินที่เป็นไปตามความต้องการคุณภาพที่ดินของพืชแต่ละชนิด จากนั้นทำการตรวจสอบภาคสนามเพื่อวิเคราะห์ความถูกต้องของแบบจำลองโดยใช้สัมประสิทธิ์ Kappa ผลที่ได้นำมาประเมินด้านเศรษฐกิจและการสูญเสียดิน เมื่อได้รับความเหมาะสมของที่ดินของ

พืชแต่ละชนิดแล้วนำชั้นความเหมาะสมของพืชทั้ง 4 ชนิดนี้ มาวิเคราะห์แบบซ้อนทับอีกครั้งหนึ่ง และกำหนดทางเลือกเฉพาะความเหมาะสมมาก และความเหมาะสมปานกลาง เพื่อเสนอทำแผนที่แบบบูรณาการพืชทั้ง 4 ชนิด ผลการศึกษาพบว่าพื้นที่ที่เหมาะสมมากสำหรับข้าว, มันสำปะหลัง, อ้อย, ยางพารา, ข้าว-อ้อย, มันสำปะหลัง-อ้อย, อ้อย-ยางพารา, มันสำปะหลัง-ยางพารา และ มันสำปะหลัง-อ้อย-ยางพารา มีเนื้อที่คิดเป็นร้อยละ 5.90, 5.04, 3.10, 0.48, 0.30, 3.85, 1.14, 1.51 และ 1.87 ของพื้นที่ตามลำดับ พื้นที่เหมาะสมปานกลางสำหรับข้าว, มันสำปะหลัง, อ้อย, ยางพารา, ข้าว-อ้อย, มันสำปะหลัง-อ้อย, อ้อย-ยางพารา, มันสำปะหลัง-ยางพารา และ มันสำปะหลัง-อ้อย-ยางพารา มีเนื้อที่คิดเป็นร้อยละ 10.23, 6.46, 0.69, 0.87, 1.18, 2.05, 6.28, 0.86 และ 3.78 ของพื้นที่ ตามลำดับ

**คำสำคัญ:** โซนนิง, ข้าว, มันสำปะหลัง, อ้อย, ยางพารา

### Abstract

Land suitability evaluation is generally established based on individual crop types which provide inadequate information for alternative combination of land use. In this study agricultural zoning is accomplished with objective of integrated

analyzing of land quality for economic crop suitability accompanied by delineating units of land as to their suitability for alternative combinations of land use with respect to economic and environmental issues. Northeast Thailand is the study area, which covers an area of about 170,000 Km<sup>2</sup>. The economic crops in the area are rice, sugar-cane, cassava and rubber tree. The suitability evaluation for each crop was conducted, based on the method described in FAO guidelines. An overlay process of defined land quality layers with the suitability model provided the land suitability for each crop. The land qualities for each crop are water availability, soil properties, salt hazard potential and topography. Land suitability layers with their class attributes were prepared for rice, sugar-cane, cassava and rubber tree. The resultant maps were checked against the ground investigation for reliability analysis. Economic return and soil erosion for each land unit of suitability map were also estimated. Simultaneously, overlay was then performed of the suitability layers and conservation areas with selection criteria of identifying highly and moderately suitable classes. The zoning that matches land uses to the highly and moderately suitable land areas was recommended with respect to the conservation area and alternative economic returns. The highly suitable areas for rice, cassava, sugar-cane, rubber tree, rice-sugar cane, sugar cane-cassava, sugar cane-rubber tree, cassava-rubber tree and sugar cane-cassava-rubber tree cover areas of about 5.90, 5.04, 3.10, 0.48, 0.30, 3.85, 1.14, 1.51 and 1.87 respectively. The suitable area for rice, cassava, sugar-cane, rubber tree, rice-sugar cane, sugar cane-cassava, sugar cane-rubber tree, cassava-rubber tree and cassava-sugar cane-rubber

tree account for 10.23, 6.46, 0.69, 0.87, 1.18, 2.05, 6.28, 0.86 and 3.78 respectively.

**Keywords:** Zoning, Rice, Cassava, Sugar-cane, Rubber tree.

## 1. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตอาหารที่สำคัญของโลก การส่งออกผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่สำคัญและสร้างรายได้ให้กับประเทศได้แก่ ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง และยางพารา ในปี พ.ศ. 2554 พบว่ามีเนื้อที่การใช้ประโยชน์ที่ดินทางการเกษตร เท่ากับ 149.25 ล้านไร่ ปรากฏอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือถึง 63.85 ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 42.78 ของพื้นที่ทั้งประเทศ (สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2556) แม้ว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะเป็นฐานการผลิตการเกษตรที่สำคัญของประเทศ แต่ก็มีข้อจำกัดความอุดมสมบูรณ์ของดินค่อนข้างต่ำและประสบกับปัญหาดินมีคุณภาพไม่ดี เช่น ปัญหาดินเค็ม ดินตื้น ลูกรัง และดินทรายจัด ซึ่งมีพื้นที่คิดเป็นร้อยละ 1.19, 14.34 และ 7.69 ของพื้นที่ทั้งภาค ตามลำดับ (ชรัตน์ มงคลสวัสดิ์, 2549) ปัญหาดังกล่าวส่งผลให้รูปแบบการทำเกษตรกรรมในพื้นที่ไม่หลากหลาย และในปัจจุบันภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนกำลังประสบปัญหาพื้นที่นาข้าวถูกแทนที่ด้วยพื้นที่ปลูกยางพารา (Mongkolsawat, C., 2012) การมีทรัพยากรอยู่อย่างจำกัดในขณะที่การเพิ่มขึ้นของประชากรอย่างต่อเนื่องและความต้องการผลิตภัณฑ์ทั้งในด้านอาหารและไม่ใช่อาหารที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและความต้องการใช้ที่ดินเพิ่มขึ้นและไม่ตรงตามศักยภาพของพื้นที่ ซึ่งการปลูกพืชในพื้นที่ไม่เหมาะสมนอกจากจะทำให้ขาดทุนในการผลิตแล้วยังเป็นตัวเร่งให้เกิดการสูญเสียดินเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นการวางแผนการใช้ที่ดินเป็นสิ่งที่สำคัญซึ่งมีจุดประสงค์หลักเพื่อเป็นแนวทางในการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า และเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้ดำเนินไปในทางที่ถูกต้องและไม่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม หรือกระทบให้น้อยที่สุด จึงมีงานวิจัยที่สนับสนุนการตัดสินใจ เพื่อการวางแผนการใช้ที่ดินด้านการเกษตรในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ Mongkolsawat et al. (1999) Charauppat et al. (2003) Paiboonsak et al. (2004) Mongkolsawat et al. (2006a) และ Benjaporn et al. (2012) ได้เสนอให้ทำการบูรณาการคุณภาพที่ดินเพื่อประเมินความเหมาะสมของที่ดินในแต่ละประเภทที่ต้องการการใช้ที่ดินแตกต่างกันเสียก่อน จากนั้นจัดทำแผนการใช้ที่ดินที่ควรจะมีไว้ในรูปแบบของชั้นข้อมูลเฉพาะ ทั้งนี้สามารถนำข้อมูลมาใช้ได้อย่างรวดเร็วและปรับปรุงได้สะดวก (Hoobler et al., 2003; Boix et al., 2008; Amiri et al., 2012) การวางแผนการใช้ที่ดินมีจุดมุ่งหมายในการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ที่ดิน ซึ่งที่ดินที่ต่างกันจะมีศักยภาพหรือข้อจำกัดที่ต่างกัน จึงเหมาะสมสำหรับปลูกพืชหลายชนิดหรือพืชเฉพาะอย่าง เพื่อให้เกิดการใช้ที่ดินที่เหมาะสมกับศักยภาพ การวิเคราะห์ความเหมาะสมสำหรับพืชแต่ละชนิดจึงต้องทำการจับคู่ระหว่างความต้องการการใช้ที่ดินกับคุณภาพที่ดินจากนั้นให้ค่าคะแนน แล้วทำการบูรณาการคุณภาพที่ดินเพื่อกำหนดพื้นที่ความเหมาะสม ซึ่งเป็นการมองพื้นที่ในขอบเขตหนึ่งสำหรับพืชหลายชนิดหรือกำหนดทางเลือกเพื่อปลูกพืชชนิดอื่นที่เหมาะสมได้ สามารถลดอุปทานและสร้างแนวทางเพิ่มค่าหรือราคาของพืชผล ในขณะที่เดียวกันสามารถลดความเสี่ยงต่อการขาดทุนได้ การกำหนดเขตการใช้ที่ดินเพื่อปลูกพืชเศรษฐกิจหลายอย่างในเวลาเดียวกันในพื้นที่ดินแบบเดียวกันด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มีประสิทธิภาพในการบูรณาการความเหมาะสมของที่ดินของแต่ละพืชเพื่อสร้างทางเลือกในการตัดสินใจปลูกพืชเป็นสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการกำหนดนโยบายการใช้ที่ดินตอบสนองความต้องการของภาครัฐที่ต้องการลดการปลูกพืชบางชนิดเพื่อยกระดับราคาได้ นอกจากนี้ฐานข้อมูลที่จัดเก็บสามารถปรับแก้ตามความผันผวนของคุณภาพที่ดินบางประเภทได้

การศึกษาครั้งนี้ได้เสนอแนวทางในการโซนนิ่งทางเลือกการใช้ที่ดินที่หลากหลายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้วยการบูรณาการความเหมาะสมของที่ดินสำหรับปลูกพืช ข้อมูลความเหมาะสมของที่ดินได้

จากการประเมินคุณภาพที่ดินสำหรับปลูกพืชแต่ละชนิดตามแนวทางของ FAO ที่ได้เสนอไว้ในปี 1983 เป็นหลักการที่สำคัญเพื่อวางแผนการใช้ที่ดินอย่างสอดคล้องกับศักยภาพของที่ดินและเพิ่มทางเลือกการใช้ประโยชน์ที่ดินให้กับเกษตรกรในกรณีราคาพืชเกษตรที่ขายได้ผันผวนตลอดเวลา และลดปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรนำไปสู่ความยั่งยืน

## 2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อประเมินความเหมาะสมของที่ดินสำหรับปลูกพืชเศรษฐกิจ ได้แก่ ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง และยางพารา ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

2.2 เพื่อทำโซนนิ่งพื้นที่การเกษตรเชิงพื้นที่ด้วยการสร้างขอบเขตหน่วยการใช้ที่ดินที่เหมาะสมสำหรับการผสมผสานทางเลือกการใช้ที่ดิน ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

## 3. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

3.1 มีข้อมูลเชิงพื้นที่ประกอบการตัดสินใจเพื่อการวางแผนการใช้ที่ดินในระดับจังหวัด และภูมิภาค ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.2 มีข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจทางเลือกผลิตพืชเกษตรที่หลากหลายและยืดหยุ่นตามศักยภาพของพื้นที่


3.3 ลดความเสี่ยงต่อการขาดทุนในการผลิตพืชเศรษฐกิจในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมหรือไม่มีความเหมาะสม

## 4. พื้นที่ศึกษา

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ตั้งอยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 14 องศา 14 ลิปดา ถึง 18 องศา 27 ลิปดาเหนือ และระหว่างเส้นแวงที่ 101 องศา 15 ลิปดา ถึง 105 องศา 35 ลิปดาตะวันออก มีเนื้อที่ประมาณ 168,825.34 ตารางกิโลเมตร (ชรัตน์ มงคลสวัสดิ์, 2549) คิดเป็น 1 ใน 3 ของพื้นที่ประเทศ แบ่งการปกครองออกเป็น 20 จังหวัด ดังภาพที่ 1 ลักษณะสภาพพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความสูงทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ หรือบริเวณจังหวัดเลยและลาดเอียงลงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ระดับความสูงเหนือระดับน้ำทะเลปานกลางอยู่ในช่วง

ประมาณ 120-1,700 เมตร มีเทือกเขาเพชรบูรณ์ ดงพญาเย็น และสันกำแพง ในแนวขอบทางทิศตะวันตกเฉียงลงและล้อมรอบไปทางทิศใต้ ทางตอนกลางของภาคมีแนวเทือกเขาภูพาน แบ่งภูมิภาคออกเป็น 2 ส่วน ตามลักษณะการรับน้ำ (Basin) ได้แก่ แอ่งสกลนคร ซึ่งอยู่ทางตอนบนและแอ่งโคราช ซึ่งอยู่ทางตอนล่าง ดังภาพที่ 1 สภาพพื้นที่ภายในแต่ละแอ่ง เป็นที่เนินสลับกับที่ราบ คล้ายลูกคลื่นลอนลาด การใช้ประโยชน์ที่ดินบนพื้นที่เนินหรือที่ดอน ส่วนใหญ่ใช้ปลูกพืชไร่ เช่น อ้อย มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น รองลงมาเป็นไม้ยืนต้น ยางพารา และป่าไม้ สำหรับการใช้น้ำที่ดินบนที่ราบหรือที่ราบลุ่ม ใช้ปลูกข้าวเป็นหลัก

การทำเกษตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออาศัยน้ำฝนเป็นหลัก ปริมาณน้ำฝนรายปีเฉลี่ยเชิงพื้นที่อยู่ในช่วง 900-3,000 มิลลิเมตร โดยพื้นที่ส่วนใหญ่ทางด้านตะวันตกมีปริมาณน้อยสุด และปริมาณจะเพิ่มมากขึ้นทางด้านตะวันออก แม่น้ำสายสำคัญต่อการเกษตรได้แก่ แม่น้ำโขง แม่น้ำชี และแม่น้ำมูล อยู่ในบริเวณตอนบน ตอนกลาง และตอนล่าง ของภูมิภาค ตามลำดับ



ภาพที่ 1 พื้นที่ศึกษา

## 5. วิธีการศึกษา

### 5.1 หลักในการศึกษา

การศึกษาค้นคว้าได้สร้างข้อมูลภูมิสารสนเทศการผสมผสานทางเลือกการใช้ที่ดินเชิงพื้นที่ด้วยการสร้างขอบเขตหน่วยการใช้ที่ดินที่เหมาะสม จากการบูรณาการคุณภาพที่ดินตามหลักการประเมินที่ดินของ FAO (1983) เพื่อประเมินความเหมาะสมของที่ดินสำหรับปลูกพืช

เศรษฐกิจ ได้แก่ ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง และยางพารา จากนั้นบูรณาการข้อมูลแบบซ้อนทับชั้นข้อมูลความเหมาะสมของที่ดินสำหรับพืชแต่ละชนิด เพื่อคัดเลือกเฉพาะบริเวณที่มีความเหมาะสมมากและปานกลาง เพื่อสร้างสารสนเทศสนับสนุนการจัดทำแผนที่โซนนิ่งพื้นที่การเกษตรสำหรับการผสมผสานทางเลือกการใช้ที่ดิน แสดงขั้นตอนการศึกษา ดังภาพที่ 2

### 5.2 ขั้นตอนการศึกษา

ขั้นตอนในการสร้างข้อมูลภูมิสารสนเทศโซนนิ่งพื้นที่การเกษตรสำหรับการผสมผสานทางเลือกการใช้ที่ดินประกอบไปด้วย 7 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การคัดเลือกคุณภาพที่ดินและวิเคราะห์ความต้องการใช้ที่ดินสำหรับพืชเศรษฐกิจ 2) การรวบรวมข้อมูล 3) การบูรณาการคุณภาพที่ดินเพื่อประเมินความเหมาะสมของที่ดินสำหรับปลูกพืชเศรษฐกิจ 4) การประเมินความเหมาะสมของที่ดินสำหรับปลูกพืชเศรษฐกิจในภาพรวม 5) การตรวจสอบความถูกต้อง 6) การวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจ และ 7) การโซนนิ่งพื้นที่การเกษตรสำหรับการผสมผสานทางเลือกการใช้ที่ดินสามารถอธิบายแต่ละขั้นตอนได้ดังต่อไปนี้

#### 5.2.1 การคัดเลือกคุณภาพที่ดินและวิเคราะห์ความต้องการใช้ที่ดินสำหรับปลูกพืชเศรษฐกิจ

พืชแต่ละชนิดมีความต้องการการใช้ที่ดินที่เหมาะสมสำหรับการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตแตกต่างกัน เช่น ปริมาณธาตุอาหารในดิน สภาพภูมิอากาศ สภาพพื้นที่ ความลึกดิน ความเป็นกรดเป็นด่างในดิน เป็นต้น ปัจจัยเหล่านี้เรียกว่าปัจจัยวินิจฉัย (Diagnostic Factor) ซึ่ง FAO (1983) ได้กำหนดและรวบรวมไว้ในรูปแบบของคุณภาพที่ดิน (Land Quality) ทั้งสิ้น 25 คุณภาพที่ดิน โดยในแต่ละคุณภาพที่ดินอาจประกอบด้วยปัจจัยวินิจฉัยประเภทเดียวหรือหลายประเภท สำหรับคุณภาพที่ดินที่เหมาะสมสำหรับการประเมินค่าที่ดินเพื่อปลูกพืชเศรษฐกิจในประเทศไทย ถูกรวบรวมไว้ทั้งสิ้น 12 คุณภาพที่ดิน (กรมพัฒนาที่ดิน, 2539) ในการศึกษาครั้งนี้ได้ทำการคัดเลือกคุณภาพที่ดินสำหรับพืชเศรษฐกิจในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง และยางพารา ตามที่ FAO (1983) เสนอไว้ จำนวน 8 คุณภาพ

ที่ดิน จากปัจจัยวินิจฉัยทั้งสิ้น 13 ปัจจัย ซึ่งแสดงตารางความต้องการใช้ที่ดินสำหรับข้าว อ้อย มันสำปะหลัง และยางพารา ดังตารางที่ 1-2, 3-4, 5-6, 7-8 ตามลำดับ

**ตารางที่ 1 ความต้องการใช้ที่ดินและการให้ค่าคะแนนสำหรับข้าว**

ความต้องการใช้ที่ดินสำหรับข้าว			ค่าคะแนนปัจจัย				ที่มา
คุณภาพที่ดิน	ปัจจัยวินิจฉัย	หน่วย	S1 (1.0)	S2 (0.8)	S3 (0.4)	N (0)	
1.น้ำที่เป็นประโยชน์ต่อพืช (W)	ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายปี	mm.	> 1,500	1,100-1,500	800-1,100	< 800	ชรัตน์และคณะ (2552ก)
	พื้นที่ชลประทาน	-	พื้นที่ชลประทาน	-	-	-	
2.ดัชนีความเป็นประโยชน์ธาตุอาหารพืช (NAI)	NAI = N * P * K * pH	-	≥0.5	0.100-0.500	0.001-0.100	< 0.001	Radclyffe and Rochette (1982)
	ไนโตรเจนในดิน (N)	%	> 0.5	0.08-0.50	0.04-0.08	< 0.04	
	ฟอสฟอรัสในดิน (P)	ppm	> 50	25-50	10-25	< 10	ชรัตน์และคณะ (2552ก)
	โพแทสเซียมในดิน (K)	ppm	> 60	30-60	< 30	-	
	ความเป็นกรดเป็นด่างในดิน (pH)	-	5.6-7.3	7.4-7.8, 4.5-5.5	7.9-8.4, 4.0-4.5	> 8.4, < 4.0	
3.ความเป็นประโยชน์ของออกซิเจนต่อรากพืช (O)	สภาพการระบายน้ำของดิน	class	เลว, เลวมาก	ค่อนข้างเลว	ดี ปานกลาง	ดี, ดีมาก	ชรัตน์และคณะ (2552ก)
4.การรักษาน้ำของเนื้อดิน (I)	เนื้อดิน	class	CL, SiCL, SiCL, C	S, SiL	LS, SCL, ,SL	S, G, S SS,F	ชรัตน์และคณะ (2552ก)
5.สภาวะการหยั่งลึกของราก (R)	ความลึกของดิน	cm.	>50	25-50	15-25	<15	ชรัตน์และคณะ (2552ก)
6.การมีเกลือมากเกินไป (D)	ศักยภาพการเกิดดินเค็ม	class	Non-saline	Low	Medium	High	ชรัตน์และคณะ (2552ก)
7.สภาพพื้นที่ (G)	ภูมิสัณฐานความลาดชันของพื้นที่	-	ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิสัณฐานและความลาดชันของพื้นที่ (ตารางที่ 2)				ชรัตน์และคณะ (2552ก)
8. ความเสียหายจากการกัดกร่อน (H)	ปริมาณการสูญเสียดิน	ตัน/ไร่/ปี	< 2	2-4	4-12	> 12	กรมพัฒนาที่ดิน (2539)

**หมายเหตุ :** เนื้อดิน : L=Loam, SiCL=Silty clay loam, SiL=Silty loam, SCL=Sandy clay loam, CL=Clay loam, SL=Sandy loam, C=Clay, LS=Loamy sand, SC=Sandy clay, SiC=Silty clay, S=Sand, G=Gravel soil, SC=Slope complex, AC=Alluvial complex, F=Fragmental, SS= Skeleton soil  
**ศักยภาพการเกิดดินเค็ม :** High = พื้นที่ที่มีผลกระทบจากเกลือมากที่สุด, Medium = พื้นที่ที่มีผลกระทบจากเกลือปานกลาง, Low = พื้นที่ที่มีผลกระทบจากเกลือน้อย, Non-saline = พื้นที่ที่ไม่มีเค็ม

**ตารางที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิสัณฐานและความลาดชันของพื้นที่สำหรับข้าว**

Landform	Slope (%)		
	0-2	2-5	> 5
Flood plain	S1	-	-
Low terrace	S1	S2	-
Middle terrace	S2	S3	-
High terrace	S3	S3	N
Foot slope & Erosion surface	S3	N	N
Mountain & Outcrop	N	N	N

**ตารางที่ 3 ความต้องการใช้ที่ดินและการให้ค่าคะแนนสำหรับอ้อย**

ความต้องการใช้ที่ดินสำหรับอ้อย			ค่าคะแนนปัจจัย				ที่มา
คุณภาพที่ดิน	ปัจจัยวินิจฉัย	หน่วย	S1 (1.0)	S2 (0.8)	S3 (0.4)	N (0)	
1.น้ำที่เป็นประโยชน์ต่อพืช (W)	ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายปี	mm.	>1m600	1,100-1,600	800-1,100	<800	ชรัตน์และคณะ (2552ก)
2.ดัชนีความเป็นประโยชน์ธาตุอาหารพืช (NAI)	NAI = N * P * K * pH	-	≥0.500	0.100-0.500	0.001-0.100	<0.001	Radclyffe and Rochette (1982)
	ไนโตรเจนในดิน (N)	%	>0.2	0.1-0.2	<0.1	-	
	ฟอสฟอรัสในดิน (P)	ppm	>25	6-25	<6	-	ชรัตน์และคณะ (2552ก)
	โพแทสเซียมในดิน (K)	ppm	>60	30-60	<30	-	
	ความเป็นกรดเป็นด่างในดิน (pH)	-	6.1-7.3	7.4-7.8, 5.1-6.0	7.9-8.4, 4.0-5.0	>8.4, <4.0	
3.ความเป็นประโยชน์ของออกซิเจนต่อรากพืช (O)	สภาพการระบายน้ำของดิน	class	ดี, ดีมาก	ดีปานกลาง	ค่อนข้างดี, เลว, เลวมาก	ค่อนข้างเลว	ชรัตน์และคณะ (2552ก)
4.การรักษาน้ำของเนื้อดิน (I)	เนื้อดิน	class	C(<65%), L,SCL, SiCL, SiL, CL, L	SiCL, SL	SiC, LS	C(>65%), G, SC, AC, S SS,F	ชรัตน์และคณะ (2552ก)
5.สภาวะการหยั่งลึกของราก (R)	ความลึกของดิน	cm.	>100	50-100	25-50	<25	ชรัตน์และคณะ (2552ก)
6.การมีเกลือมากเกินไป (D)	ศักยภาพการเกิดดินเค็ม	class	Non-saline	Low	Medium	High	ชรัตน์และคณะ (2552ก)
7.สภาพพื้นที่ (G)	ภูมิสัณฐานความลาดชันของพื้นที่	-	ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิสัณฐานและความลาดชันของพื้นที่ (ตารางที่ 4)				ชรัตน์และคณะ (2552ก)
8. ความเสียหายจากการกัดกร่อน (H)	ปริมาณการสูญเสียดิน	ตัน/ไร่/ปี	< 2	2-4	4-12	> 12	กรมพัฒนาที่ดิน (2539)

**หมายเหตุ :** เนื้อดิน : L=Loam, SiCL=Silty clay loam, SiL=Silty loam, SCL=Sandy clay loam, CL=Clay loam, SL=Sandy loam, C=Clay, LS=Loamy sand, SC=Sandy clay, SiC=Silty clay, S=Sand, G=Gravel soil, SC=Slope complex, AC=Alluvial complex, F=Fragmental, SS= Skeleton soil  
**ศักยภาพการเกิดดินเค็ม :** High = พื้นที่ที่มีผลกระทบจากเกลือมากที่สุด, Medium = พื้นที่ที่มีผลกระทบจากเกลือปานกลาง, Low = พื้นที่ที่มีผลกระทบจากเกลือน้อย, Non-saline = พื้นที่ที่ไม่มีเค็ม

**ตารางที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิสัณฐานและความลาดชันของพื้นที่สำหรับอ้อย**

Landform	Slope (%)			
	0-2	2-5	5-12	>12
Flood plain	N	-	-	-
Low terrace	N	S1	-	-
Middle terrace	S1	S2	-	-
High terrace	S2	S3	S3	-
Foot slope & Erosion surface	S1	S2	S3	N
Mountain & Outcrop	N	N	N	N

**ตารางที่ 5** ความต้องการใช้ที่ดินและการให้ค่าคะแนน สำหรับมันสำปะหลัง

ความต้องการใช้ที่ดินสำหรับมันสำปะหลัง			ค่าคะแนนปัจจัย				ที่มา
คุณภาพที่ดิน	ปัจจัยวินิจฉัย	หน่วย	S1 (1.0)	S2 (0.8)	S3 (0.4)	N (0)	
1.น้ำที่เป็นประโยชน์ต่อพืช (W)	ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายปี	mm.	1,100-1,500	1,500-2,500	2,500-4,000	<500	Radcliffe and Rochette (2553)
2.ดัชนีความเป็นอาหารพืช (NAI)	NAI = N * P * K * pH	-	≥0.500	0.100-0.500	0.001-0.100	< 0.001	Radcliffe and Rochette (1982)
3.ความเป็นประโยชน์ของออกซิเจนต่อรากพืช (O)	ไนโตรเจนในดิน (N)	%	>0.2	0.1-0.2	<0.1	-	Radcliffe and Rochette (2553)
	ฟอสฟอรัสในดิน (P)	ppm	>25	6-25	<6	-	
	โพแทสเซียมในดิน (K)	ppm	>60	30-60	<30	-	
	ความเป็นกรดเป็นด่างในดิน (pH)	-	6.1-7.3	7.4-7.8, 5.1-6.0	7.9-8.4, 4.0-5.0	>8.4, <4	
4.การรักษาหน้าของเนื้อดิน (I)	เนื้อดิน	class	L, SIL, Si, SL	LS	SIC, CL, SCL, AC, S, SS, F, SICL	C, G, SC, AC, S, SS, F	Radcliffe and Rochette (2553)
5.สภาวะการหยั่งลึกของราก (R)	ความลึกของดิน	cm.	>100	50-100	25-50	<25	Radcliffe and Rochette (2553)
6.การมีเกลือมากเกินไป (D)	ศักยภาพการเกิดดินเค็ม	class	Non-saline	Low	Medium	High	Radcliffe and Rochette (2553)
7.สภาพพื้นที่ (G)	ภูมิสัณฐานความลาดชันของพื้นที่	-	ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิสัณฐานและความลาดชันของพื้นที่ (ตารางที่ 6)				Radcliffe and Rochette (2553)
8.ความเสียหายจากการกัดกร่อน (H)	ปริมาณการสูญเสียดิน	ตัน/ไร่/ปี	<2	2-4	4-12	> 12	กรมพัฒนาที่ดิน (2539)

**หมายเหตุ :** เนื้อดิน : L=Loam, SICL=Silty clay loam, SIL=Silty loam, SCL= Sandy clay loam, CL=Clay loam, SL=Sandy loam, C=Clay, LS=Loamy sand, SC=Sandy clay, SIC=Silty clay, S=Sand, G=Gravel soil, SC=Slope complex, AC=Alluvial complex, F=Fragmental, SS=Skeleton soil

**ศักยภาพการเกิดดินเค็ม :** High = พื้นที่ที่มีผลกระทบจากเกลือมากที่สุด, Medium = พื้นที่ที่มีผลกระทบจากเกลือปานกลาง, Low = พื้นที่ที่มีผลกระทบจากเกลือน้อย, Non-saline = พื้นที่ที่ไม่มีเค็ม

**ตารางที่ 6** ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิสัณฐานและความลาดชันของพื้นที่สำหรับมันสำปะหลัง

Landform	Slope (%)			
	0-2	2-5	5-12	>12
Flood plain	N	-	-	-
Low terrace	N	S1	S2	S3
Middle terrace	S1	S2	S3	S3
High terrace	S2	S3	S3	N
Foot slope & Erosion surface	S1	S2	S3	N
Mountain & Outcrop	N	N	N	N

**ตารางที่ 7** ความต้องการใช้ที่ดินและการให้ค่าคะแนน สำหรับยางพารา


ความต้องการใช้ที่ดินสำหรับยางพารา			ค่าคะแนนปัจจัย				ที่มา
คุณภาพที่ดิน	ปัจจัยวินิจฉัย	หน่วย	S1 (1.0)	S2 (0.8)	S3 (0.4)	N (0)	
1.น้ำที่เป็นประโยชน์ต่อพืช (W)	ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายปี	mm.	1,500-2,000	2,000-3,000	3,000-4,000	>4,000	Radcliffe and Rochette (2553)
2.ดัชนีความเป็นอาหารพืช (NAI)	NAI = N * P * K * pH	-	≥0.500	0.100-0.500	0.001-0.100	< 0.001	Radcliffe and Rochette (1982)
3.ความเป็นประโยชน์ของออกซิเจนต่อรากพืช (O)	ไนโตรเจนในดิน (N)	%	>0.2	0.1-0.2	<0.1	-	Radcliffe and Rochette (2553)
	ฟอสฟอรัสในดิน (P)	ppm	>15	10-15	3-10	-	
	โพแทสเซียมในดิน (K)	ppm	>30	<30	-	-	
	ความเป็นกรดเป็นด่างในดิน (pH)	-	5.0-7.3	7.3-8.0, 4.0-5.0	3.5-4.0	>8.0, <3.5	
4.การรักษาหน้าของเนื้อดิน (I)	เนื้อดิน	class	SIC, SICL, C, L, SCL, Si, CL, L	SL	LS	C (%clay>65), G, SC, A, C, S, SS, F	Radcliffe and Rochette (2553)
5.สภาวะการหยั่งลึกของราก (R)	ความลึกของดิน	cm.	>150	100-150	50-100	<50	Radcliffe and Rochette (2553)
6.การมีเกลือมากเกินไป (D)	ศักยภาพการเกิดดินเค็ม	class	Non-saline	Low	Medium	High	Radcliffe and Rochette (2553)
7.สภาพพื้นที่ (G)	ภูมิสัณฐานความลาดชันของพื้นที่	-	ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิสัณฐานและความลาดชันของพื้นที่ (ตารางที่ 8)				Radcliffe and Rochette (2553)
8.ความเสียหายจากการกัดกร่อน (H)	ปริมาณการสูญเสียดิน	ตัน/ไร่/ปี	< 2	2-4	4-12	> 12	กรมพัฒนาที่ดิน (2539)

**หมายเหตุ :** เนื้อดิน : L=Loam, SICL=Silty clay loam, SIL=Silty loam, SCL= Sandy clay loam, CL=Clay loam, SL=Sandy loam, C=Clay, LS=Loamy sand, SC=Sandy clay, SIC=Silty clay, S=Sand, G=Gravel soil, SC=Slope complex, AC=Alluvial complex, F=Fragmental, SS=Skeleton soil

**ศักยภาพการเกิดดินเค็ม :** High = พื้นที่ที่มีผลกระทบจากเกลือมากที่สุด, Medium = พื้นที่ที่มีผลกระทบจากเกลือปานกลาง, Low = พื้นที่ที่มีผลกระทบจากเกลือน้อย, Non-saline = พื้นที่ที่ไม่มีเค็ม

**ตารางที่ 8** ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิสัณฐานและความลาดชันของพื้นที่สำหรับยางพารา

Landform	Slope (%)				
	0-2	2-5	5-12	12-35	>35
Flood plain	N	N	N	N	N
Low terrace	N	S2	S2	S3	N
Middle terrace	S1	S2	S2	S3	N
High terrace	S1	S2	S2	S3	N
Foot slope & Erosion surface	S1	S2	S2	S3	N
Mountain & Outcrop	N	N	N	N	N



ภาพที่ 2 ขั้นตอนการศึกษา

### 5.2.2 การรวบรวมข้อมูล

เมื่อคัดเลือกข้อมูลปัจจัยวินิจฉัยที่มีความสอดคล้องกับความต้องการการใช้ที่ดินสำหรับปลูกข้าว อ้อย มันสำปะหลัง และยางพารา จึงทำการรวบรวมข้อมูลปัจจัยวินิจฉัยต่างๆ ที่สามารถนำไปสร้างข้อเสนอแนะคุณภาพที่ดิน ซึ่งข้อมูลที่ได้ทำการรวบรวมมาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ทำการเก็บข้อมูลในรูปแบบแผนที่เชิงเลขหรือแผนที่กระดาษ และข้อมูลเอกสารหรือข้อมูลลักษณะสัมพันธ์แสดงรายละเอียดของข้อมูลที่รวบรวมในรูปแบบเชิงพื้นที่ และข้อมูลลักษณะสัมพันธ์ ดังตารางที่ 9 และ 10

### 5.2.3 การบูรณาการคุณภาพที่ดินเพื่อประเมิน

#### ความเหมาะสมของที่ดินสำหรับปลูกพืชเศรษฐกิจ

การประเมินความเหมาะสมของที่ดินสำหรับพืชเศรษฐกิจ เป็นการบูรณาการชั้นคุณภาพที่ดินเชิงพื้นที่ที่ได้คัดเลือกไว้จำนวน 8 ชั้นคุณภาพที่ดินตามความต้องการใช้ที่ดินของพืช โดยนำหลักการประเมินคุณภาพที่ดินตามแนวทางของ FAO (1983) ที่ได้เสนอไว้ โดยประเมินความเหมาะสมของที่ดินครั้งละหนึ่งชนิดพืช ขั้นตอนในการ

ประเมินประกอบด้วยการบูรณาการปัจจัยวินิจฉัยโดยกำหนดระดับความเหมาะสม (Factor rating) ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างหน่วยแผนที่ดินหรือข้อมูลเชิงพื้นที่ที่มีลักษณะสัมพันธ์ที่แสดงถึงระดับความเหมาะสมของชั้นข้อมูลคุณภาพที่ดินสำหรับพืชเศรษฐกิจแต่ละชนิด และการประเมินความเหมาะสมในภาพรวมต่อไป

#### 5.2.3.1 น้ำที่เป็นประโยชน์ต่อพืช (Water Availability)

ปัจจัยวินิจฉัยที่เป็นตัวแทนของชั้นคุณภาพที่ดินนี้คือปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายปี ซึ่งข้อมูลปริมาณน้ำฝนที่นำวิเคราะห์ในครั้งนี้เป็นข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยกรมอุตุนิยมวิทยา 27 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2518-2545 ครอบคลุมพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 308 สถานี นำมาสร้างเป็นชั้นข้อมูลน้ำฝนเชิงพื้นที่ โดยวิธีการประมาณค่าด้วยวิธี Kriging กำหนดเป็นชั้นข้อมูล W ซึ่งกำหนดค่าคะแนนและจัดระดับความเหมาะสมสำหรับข้าว อ้อย มันสำปะหลัง และยางพารา ดังตารางที่ 1, 3, 5 และ 7 ตามลำดับ

ตารางที่ 9 ข้อมูลเชิงพื้นที่ที่ใช้ในการวิจัย

ข้อมูลเชิงพื้นที่	ชื่อชั้นข้อมูล	มาตราส่วน	ที่มาของข้อมูล	ปีที่จัดเก็บ
กลุ่มชุดดิน	Soil_gr	1:50,000	กรมพัฒนาที่ดิน	2548
แผนที่ภูมิประเทศ	-	1:50,000	กรมแผนที่ทหาร	2512-2538
ตำแหน่งสถานีน้ำฝน	Stn_rain	-	กรมอุตุนิยมวิทยา	2545
พื้นที่ชลประทาน	Irrigation	1:50,000	ศูนย์ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2549
ศักยภาพความเค็ม	Saltpoten_ne	1:50,000	ศูนย์ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2549
ภูมิสัณฐาน	Landform	1:50,000	ศูนย์ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2546
ความลาดชันของพื้นที่	Slope	1:50,000	ศูนย์ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2549
การใช้ประโยชน์ที่ดิน	Landuse	1:50,000	กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม	2550
ปริมาณการสูญเสียดิน	Soil loss	1:50,000	ศูนย์ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2549
ขอบเขตการปกครองระดับจังหวัด อำเภอ และตำบล	Polbndry	1:50,000	ศูนย์ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2548

ตารางที่ 10 ข้อมูลลักษณะสัมพันธ์ที่ใช้ในการวิจัย

ข้อมูลลักษณะสัมพันธ์	ที่มาของข้อมูล	รายละเอียดข้อมูล	ปีที่จัดเก็บ
ข้อมูลปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายปี	กรมอุตุนิยมวิทยา	ข้อมูลน้ำฝนเฉลี่ยสะสมรายปีทั้งหมด 27 ปี 308 สถานี	2518-2545
ข้อมูลคุณสมบัติของดินในแต่ละชุดดิน	กรมพัฒนาที่ดิน	ข้อมูลคุณสมบัติของดิน ได้แก่ ปริมาณธาตุอาหาร N, P, K ในดิน ความเป็นกรดเป็นด่างในดิน เนื้อดิน ความลึกดิน การระบายน้ำในดิน ปริมาณกรวดบนชั้นดินบน ปริมาณดินเหนียวในดิน	2548
ข้อมูลสถิติการผลิตพืชเศรษฐกิจ ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง และยางพารา	สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร	ผลผลิตพืชเศรษฐกิจ เฉลี่ย/ไร่ ข้อมูลราคาพืชเศรษฐกิจ ที่เกษตรกรขายได้ ข้อมูลต้นทุนการผลิตพืชเศรษฐกิจ	2541-2556

### 5.2.3.2 ดัชนีความเป็นประโยชน์ธาตุอาหารพืช (Nutrient availability index)

ปัจจัยวินิจฉัยที่เป็นตัวแทนของชั้นคุณภาพที่ดินนี้ได้แก่ ไนโตรเจนในดิน ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ในดิน โพแทสเซียมในดิน และปฏิกิริยาความเป็นกรดเป็นด่างในดิน หลักการนี้เป็นการวิเคราะห์ตามแนวความคิดจาก Radcliffe and Rochette (1982) โดยการให้ค่าคะแนนความเหมาะสมในแต่ละปัจจัยวินิจฉัย จากนั้นนำค่าคะแนนความเหมาะสมในแต่ละปัจจัยมาวิเคราะห์แบบซ้อนทับด้วยระบบ GIS และคำนวณผลคูณจากสมการที่ 1 จากนั้นนำผลคูณที่ได้จัดช่วงค่าคะแนนใหม่ดังตารางที่ 1, 3, 5 และ 7 สำหรับข้าว อ้อย มันสำปะหลัง และยางพารา ตามลำดับ

$$NAI = N \times P \times K \times pH \quad (1)$$

โดยที่ NAI = ดัชนีความเป็นประโยชน์ธาตุอาหารพืช

N = ค่าคะแนนความเหมาะสมของปัจจัยวินิจฉัยไนโตรเจนในดิน

P = ค่าคะแนนความเหมาะสมของปัจจัยวินิจฉัยฟอสฟอรัสในดิน

K = ค่าคะแนนความเหมาะสมของปัจจัยวินิจฉัยโพแทสเซียมในดิน

pH = ค่าคะแนนความเหมาะสมของปัจจัยวินิจฉัยความเป็นกรดเป็นด่างในดิน

### 5.2.3.3 ความเป็นประโยชน์ของออกซิเจนต่อรากพืช (Oxygen availability)

ปัจจัยวินิจฉัยที่เป็นตัวแทนของชั้นคุณภาพที่ดินนี้ได้แก่ สภาพการระบายน้ำของดิน ซึ่งได้จากการจัดการฐานข้อมูลกลุ่มชุดดินเชื่อมโยงด้วยตารางสภาพการระบายน้ำของดิน กำหนดให้เป็นชั้นข้อมูล O กำหนดค่าคะแนนและจัดระดับความเหมาะสม ดังตารางที่ 1, 3, 5 และ 7 สำหรับข้าว อ้อย มันสำปะหลัง และยางพารา ตามลำดับ

### 5.2.3.4 การรักษาน้ำของเนื้อดิน (Water retention)

ปัจจัยวินิจฉัยที่เป็นตัวแทนของชั้นคุณภาพที่ดินนี้ได้แก่ ข้อมูลเนื้อดิน ได้จากการจัดการฐานข้อมูลกลุ่มชุดดินเชื่อมโยงด้วยตารางเนื้อดิน กำหนดเป็นชั้นข้อมูล I โดยให้ค่าคะแนนและจัดระดับความเหมาะสม ดังตารางที่ 1, 3, 5



และ 7 สำหรับข้าว อ้อย มันสำปะหลัง และยางพารา ตามลำดับ

#### 5.2.3.5 สภาวะการหยั่งลึกของราก

(Rooting conditions)

ปัจจัยวินิจฉัยที่เป็นตัวแทนของชั้นคุณภาพที่ดินนี้ ได้แก่ ความลึกของดิน ซึ่งได้จากการจัดการฐานข้อมูลกลุ่มชุดดิน เชื่อมโยงด้วยตารางความลึกของดิน กำหนดเป็นชั้นข้อมูล R ให้ค่าคะแนนและจัดระดับความเหมาะสม ดังตารางที่ 1, 3, 5 และ 7 สำหรับข้าว อ้อย มันสำปะหลัง และยางพารา ตามลำดับ

#### 5.2.3.6 การมีเกลือมากเกินไป (Excess of salts)

นอกจากข้อจำกัดด้านความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ำ และปริมาณน้ำฝนแล้ว ปัญหาที่สำคัญอีกประการคือ ปัญหาดินเค็ม เนื่องจากพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนใหญ่มีหน่วยหินมหาสารคามรองรับอยู่ ซึ่งเป็นหน่วยหินที่มีชั้นเกลือหินเป็นองค์ประกอบทำให้เกิดปัญหาดินเค็มและเป็นตัวจำกัดการเจริญเติบโตของพืช Mongkolsawat et al (2006b) ได้กำหนดพื้นที่ที่มีผลกระทบเกลือ ออกเป็น 4 ระดับได้แก่ สูง ปานกลาง ต่ำ และ ไม่เค็ม โดยปัจจัยวินิจฉัยที่เป็นตัวแทนของชั้นคุณภาพที่ดินนี้ ได้แก่ ผลกระทบจากเกลือ กำหนดเป็นชั้นข้อมูล D โดยการค่าคะแนนในแต่ละระดับของศักยภาพความเค็ม ดังตารางที่ 1, 3, 5 และ 7 สำหรับข้าว อ้อย มันสำปะหลัง และยางพารา ตามลำดับ

#### 5.2.3.7 สภาพพื้นที่ (Topography)

ปัจจัยวินิจฉัยที่ดินที่เป็นตัวแทนของชั้นคุณภาพที่ดินนี้ มาจากการสร้างความสัมพันธ์จากเงื่อนไขแบบ Matrix convolution ระหว่างชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศและชั้นข้อมูลความลาดชันของพื้นที่ โดยการใช้การวิเคราะห์แบบซ้อนทับ กำหนดให้เป็นชั้นข้อมูล G และให้ค่าคะแนนจัดระดับความเหมาะสมของคุณภาพที่ดินนี้ ดังตารางที่ 2, 4, 6 และ 8 สำหรับข้าว อ้อย มันสำปะหลัง และยางพารา ตามลำดับ

#### 5.2.3.8 ความเสียหายจากการกัดกร่อน

(Erosion hazard)

ปัจจัยวินิจฉัยที่เป็นตัวแทนของชั้นคุณภาพที่ดินนี้ ได้แก่ ปริมาณการสูญเสียดิน (Soil loss) ซึ่งได้มาจากการ

ประเมินพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดกษัยการดินที่วิเคราะห์จาก สมการการสูญเสียดินสากล (Universal soil loss equation: USLE) (Wischmeier and Smith, 1978) ดังสมการที่ 2

$$A = R K LS C P \quad (2)$$

โดยที่ A = การสูญเสียดินต่อหน่วยของพื้นที่

R = ปัจจัยการชะล้างพังทลายของฝน

K = ปัจจัยความคงทนต่อการชะล้างพังทลายของดิน

LS = ปัจจัยความลาดชัน และความยาวความลาดชัน

C = ปัจจัยพืชพรรณที่ปกคลุมดิน

P = ปัจจัยการป้องกันการพังทลายของดิน

ปัจจัยที่ได้รวบรวมและวิธีการวิเคราะห์ ได้ใช้หลักการ เช่นเดียวกับ Mongkolsawat et al (2006c) ที่ได้ทำการประเมินพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดกษัยการดินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดระดับความรุนแรงการสูญเสียดิน 4 ระดับได้แก่ ระดับสูญเสียดินน้อย (>2 ตัน/ไร่/ปี) สูญเสียดินปานกลาง (2-4 ตัน/ไร่/ปี) สูญเสียดินรุนแรง (4-12 ตัน/ไร่/ปี) และสูญเสียดินรุนแรงมาก-มากที่สุด (>12 ตัน/ไร่/ปี) กำหนดให้เป็นชั้นข้อมูล H และให้ค่าคะแนนจัดระดับความเหมาะสมในชั้นคุณภาพที่ดินตามปริมาณการสูญเสียดิน ดังตารางที่ 1, 3, 5 และ 7 สำหรับข้าว อ้อย มันสำปะหลัง และยางพารา ตามลำดับ

#### 5.2.4 การประเมินความเหมาะสมของที่ดินสำหรับปลูกพืชเศรษฐกิจในภาพรวม

การประเมินผลรวมเป็นการนำทุกชั้นคุณภาพที่ดินที่ให้ค่าคะแนนและจัดระดับความเหมาะสมสำหรับพืชเศรษฐกิจแต่ละชนิด มาบูรณาการด้วยการซ้อนทับพร้อมกันของชั้นข้อมูล W, NAI, O, I, R, D, G และ H และจัดระดับความเหมาะสมให้ใหม่ โดยพิจารณาผลคูณจากสมการที่ 3 จากนั้นจัดช่วงค่าคะแนนใหม่ดังตาราง ที่ 11 ชั้นข้อมูลผลลัพธ์ในขั้นตอนนี้เป็นผลลัพธ์ของกระบวนการประเมินความเหมาะสมสำหรับพืชเศรษฐกิจ ตั้งชื่อชั้นข้อมูลนี้เป็น RICE\_SUIT, SUGAR\_SUIT, CASSAVA\_SUIT, RUBER\_SUIT สำหรับข้าว อ้อย มันสำปะหลัง และยางพารา ตามลำดับ

$$\text{Land Suitability} = W \times \text{NAI} \times O \times I \times R \times D \times G \times H \quad (3)$$

โดยที่ Land Suitability = ความเหมาะสมของที่ดินสำหรับ

ปลูกพืชเศรษฐกิจแต่ละชนิด

W = ค่าคะแนนความเหมาะสมของคุณภาพที่ดิน

ความเป็นประโยชน์ของน้ำ

NAI = ค่าคะแนนความเหมาะสมของคุณภาพที่ดิน

ความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหารพืช

O = ค่าคะแนนความเหมาะสมของคุณภาพที่ดิน

ความเป็นประโยชน์ของออกซิเจนต่อรากพืช

I = ค่าคะแนนความเหมาะสมของคุณภาพที่ดินการ

รักษาน้ำของเนื้อดินพืช

R = ค่าคะแนนความเหมาะสมของคุณภาพที่ดิน

สภาวะการหยั่งลึกของราก

D = ค่าคะแนนความเหมาะสมของคุณภาพที่ดินการ

มีเกลือมากเกินไป

G = ค่าคะแนนความเหมาะสมของคุณภาพที่ดิน

สภาพพื้นที่

H = ค่าคะแนนความเหมาะสมของคุณภาพที่ดิน

ความเสียหายจากการกัดกร่อน

### 5.2.5 การตรวจสอบความถูกต้อง

นำผลการประเมินความเหมาะสมของพื้นที่สำหรับปลูกพืชเศรษฐกิจแต่ละชนิด ตรวจสอบในภาคสนามในเชิงตำแหน่ง และตรวจสอบความสอดคล้องของผลผลิตในแต่ละระดับความเหมาะสมกับข้อมูลการคาดการณ์การผลิตของกรมพัฒนาที่ดิน ด้วยสัมประสิทธิ์ Kappa index (Cohen, J., 1960)

### 5.2.6 การวิเคราะห์ด้านเศรษฐศาสตร์

การวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการปลูกพืชเศรษฐกิจ ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง และยางพารา ใช้วิธีอัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (Benefit cost ratio) หรือ B/C ratio (Boardman et al, 1996) โดยข้อมูลที่นำมาวิเคราะห์เป็นข้อมูลทุติยภูมิที่ได้รวบรวมจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้แก่ ข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตรประเทศไทยในปีการเพาะปลูก 2541/42 ถึง 2556/2557 ระดับจังหวัด และ ข้อมูลพื้นฐานเศรษฐกิจการเกษตร ปีการเพาะปลูก

2541/42 ถึง 2555/2556 ระดับจังหวัด โดยได้นำข้อมูลผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ ข้อมูลต้นทุนการผลิตต่อไร่ ข้อมูลราคาที่เกี่ยวข้องกรขายได้ที่ไร่มา คำนวณหาค่า B/C ratio ดังสมการที่ 4 โดยผลที่มากกว่า 1 หมายถึงการลงทุนที่คุ้มทุนทางเศรษฐศาสตร์ ค่าที่น้อยกว่า 1 หมายถึงการลงทุนที่ไม่คุ้มทุนทางเศรษฐศาสตร์

$$\text{B/C ratio} = \frac{B_t (1 + i)^t}{C_t (1 + i)^t} \quad (4)$$

โดยที่ B/C ratio = Benefit cost ratio

$B_t$  = Total annual return,

$C_t$  = Total annual cost

n = Number of year or project duration

t = The production period in each year

i = Discount rate

### 5.2.7 การโซนนิ่งพื้นที่การเกษตรสำหรับการผสมผสานทางเลือกการใช้ที่ดิน

ในขั้นตอนนี้เป็นกระบวนการวิเคราะห์แบบซ้อนทับของชั้นข้อมูลความเหมาะสมสำหรับปลูกข้าว อ้อย มันสำปะหลัง ยางพารา และชั้นข้อมูลพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำที่ 1A, 1B และฝั่งเมือง ที่แสดงขอบเขตการกำหนดการใช้ที่ดินไว้ชัดเจนแล้ว โดยพื้นที่ที่มีความเหมาะสมมากและปานกลาง สำหรับพืชแต่ละชนิดจะถูกคัดเลือกเพื่อสร้างเป็นชั้นข้อมูลโซนนิ่งพื้นที่เหมาะสมสำหรับปลูกพืชเศรษฐกิจแบบผสมผสานทางเลือกการใช้ที่ดิน ตามชนิดของพืชเศรษฐกิจ ได้แก่ ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตารางที่ 11 ระดับความเหมาะสมตามผลคุณภาพที่ดิน

ระดับความเหมาะสม	ผลคูณ W x NAI x O x I x R x D x G x H			
	ข้าว	อ้อย	มันสำปะหลัง	ยางพารา
S1	0.584-1.00	0.584-1.00	0.584-1.00	0.584-1.00
S2	0.084-0.584	0.084-0.584	0.084-0.584	0.084-0.584
S3	0.0003-0.084	0.0003-0.084	0.0003-0.084	0.0003-0.084
N	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003

## 6. ผลการศึกษา

### 6.1 พื้นที่เหมาะสมสำหรับข้าว อ้อย มันสำปะหลัง และยางพารา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จากการประเมินค่าที่ดินเพื่อกำหนดพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับปลูกพืชเศรษฐกิจ ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง และยางพารา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สามารถจัดระดับความเหมาะสม ออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ พื้นที่เหมาะสมมาก (S1) พื้นที่เหมาะสมปานกลาง (S2) พื้นที่เหมาะสมน้อย (S3) และพื้นที่ไม่เหมาะสม (N) ตามลำดับ สามารถอธิบายการกระจายตัวของพื้นที่ได้ดังนี้

#### 6.1.1 พื้นที่เหมาะสมสำหรับข้าว

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพื้นที่เหมาะสมสำหรับปลูกข้าวส่วนใหญ่ในระดับเหมาะสมน้อย กระจายอยู่ทั่วทั้งลุ่มน้ำ ในขณะที่เดียวกันพบว่าพื้นที่ที่มีศักยภาพในระดับเหมาะสมมากและปานกลาง คิดเป็นพื้นที่ร้อยละ 6.86 และ 14.80 ของพื้นที่ทั้งหมด ดังตารางที่ 12 พื้นที่ที่มีศักยภาพสำหรับปลูกข้าวกระจายตัวในเขตพื้นที่ชลประทานและพื้นที่ราบน้ำท่วมถึงสองฝั่งของลำน้ำมูล ลำน้ำชี และลำน้ำสงคราม ดังภาพที่ 3

#### 6.1.2 พื้นที่เหมาะสมสำหรับอ้อย

พื้นที่เหมาะสมสำหรับปลูกอ้อยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งในด้านสภาพพื้นที่และลักษณะทางกายภาพและทางเคมีของดิน ซึ่งเป็นพื้นที่ในที่ดอน มี

พื้นที่ในระดับเหมาะสมมากและปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 10.26 และ 18.00 ของพื้นที่ทั้งหมด ดังตารางที่ 12 ส่วนใหญ่พบในบริเวณตอนกลางและตอนล่างของภาค กระจายตัวไปโดยเฉพาะบริเวณที่เป็นที่ดอนหรือที่เนิน ดังภาพที่ 3

#### 6.1.3 พื้นที่เหมาะสมสำหรับมันสำปะหลัง


มันสำปะหลังเป็นพืชที่สนับสนุนความมั่นคงด้านอาหารและสามารถปลูกได้ทั้งในดินที่มีความอุดมสมบูรณ์น้อยและดินเลว เพื่อกำหนดการวางแผนการใช้ที่ดินที่เหมาะสม จึงจำเป็นต้องประเมินเพื่อหาพื้นที่ที่มีศักยภาพจากการประเมินพบว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพื้นที่ที่มีศักยภาพมากที่สุดสำหรับปลูกมันสำปะหลัง ซึ่งมีเนื้อที่ระดับเหมาะสมมากและปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 18.19 และ 16.69 ของพื้นที่ทั้งหมด ดังตารางที่ 12 แสดงการกระจายตัวทั่วไปในที่ดอน บริเวณตอนล่างและตอนกลางของภาค ดังภาพที่ 3

#### 6.1.4 พื้นที่เหมาะสมสำหรับยางพารา

พื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีพื้นที่ศักยภาพสำหรับปลูกยางพารา ในระดับความเหมาะสมมาก เพียงร้อยละ 5.28 กระจายตัวอยู่ในบริเวณตอนบนของภาค และระดับความเหมาะสมปานกลาง ร้อยละ 16.70 ดังตารางที่ 12 กระจายตัวอยู่ในบริเวณบริเวณตอนกลาง และบางส่วนในตอนล่างของภาค ดังภาพที่ 3

ตารางที่ 12 พื้นที่เหมาะสมสำหรับ ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง และยางพารา

ระดับความเหมาะสม	ข้าว		อ้อย		มันสำปะหลัง		ยางพารา	
	ไร่	ร้อยละ	ไร่	ร้อยละ	ไร่	ร้อยละ	ไร่	ร้อยละ
S1	7,238,082.51	6.86	10,827,740.43	10.26	19,188,472.94	18.19	5,576,102.326	5.28
S2	15,621,422.00	14.80	18,989,262.43	18.00	17,608,609.03	16.69	17,621,533.88	16.70
S3	36,434,855.64	34.53	11,874,279.67	11.25	8,451,916.10	8.01	20,084,411.33	19.03
N	27,543,520.20	26.10	45,146,597.82	42.79	41,588,882.28	39.41	43,555,832.81	41.28
F	13,833,768.83	13.11	13,833,768.83	13.11	13,833,768.83	13.11	13,833,768.83	13.11
U	2,681,988.11	2.54	2,681,988.11	2.54	2,681,988.11	2.54	2,681,988.11	2.54
W	2,162,200.21	2.05	2,162,200.21	2.05	2,162,200.21	2.05	2,162,200.214	2.05
รวม	105,515,837.50	100.00	105,515,837.50	100.00	105,515,837.50	100.00	105,515,837.50	100.00



ภาพที่ 3 ความเหมาะสมของที่ดินสำหรับปลูกข้าว อ้อย มันสำปะหลัง และยางพารา

## 6.2 โซนนิ่งพื้นที่การเกษตรสำหรับการผสมผสานทางเลือกการใช้ที่ดินที่หลากหลาย

การโซนนิ่งเป็นการสร้างหน่วยที่ดินตามความเหมาะสมและศักยภาพของพื้นที่สำหรับใช้ประโยชน์ในการปลูกพืชแต่ละชนิดเป็นหลัก โดยเลือกเฉพาะพื้นที่ที่เหมาะสมมากและปานกลาง สามารถจัดทำโซนนิ่งสำหรับการผสมผสานทางเลือกการใช้ที่ดินที่หลากหลาย โดย

กำหนดเป็นหน่วยแผนที่จำนวน 23 หน่วย ดังตารางที่ 13 และแสดงแผนที่การโซนนิ่งสำหรับการผสมผสานทางเลือกการใช้ที่ดินที่หลากหลาย ดังภาพที่ 4 อธิบายรายละเอียดดังต่อไปนี้

### 6.2.1 โซนนิ่งพื้นที่เหมาะสมมาก

หน่วยที่ดินพื้นที่ที่เหมาะสมมากหรือมีคุณสมบัติทางกายภาพที่เหมาะสมมากต่อการปลูกพืชเศรษฐกิจ ข้าว

อ้อย มันสำปะหลัง และยางพารา คิดเป็นร้อยละ 23.18 ของพื้นที่ โดยสามารถไถนึ่งพื้นที่ได้ทั้งพืชชนิดเดียว และเพิ่มทางเลือกการใช้ที่ดินด้วยการผสมผสานด้วยพืชหลายชนิด มีรายละเอียดดังนี้

#### 6.2.1.1 ไถนึ่งพื้นที่เหมาะสมมากสำหรับปลูกพืชเดี่ยว

หน่วยที่ดินที่สามารถปลูกพืชเศรษฐกิจได้เพียงชนิดใดชนิดหนึ่งเท่านั้นเนื่องจากข้อจำกัดเชิงกายภาพของพื้นที่บางชนิด จึงเหมาะสมกับการปลูกพืชเพียงชนิดเดียว หน่วยแผนที่ดินนี้ ได้แก่หน่วยแผนที่ 1-4 เป็นพื้นที่ไถนึ่งสำหรับปลูก ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง หรือ ยางพารา ตามลำดับ มีพื้นที่คิดเป็นร้อยละ 5.90 3.10 5.04 และ 0.48 ตามลำดับ ตารางที่ 13 และแสดงการกระจายตัวของพื้นที่ที่มีศักยภาพ ดังภาพที่ 4

#### 6.2.1.2 ไถนึ่งพื้นที่เหมาะสมมากสำหรับปลูกพืชหลายชนิด

พื้นที่เหมาะสมมากสำหรับปลูกได้หลายชนิด เป็นพื้นที่ที่มีความเหมาะสมทางด้านกายภาพมาก เป็นแนวทางในการการผสมผสานการใช้ที่ดินได้มากกว่าหนึ่งทางเลือก เช่น พื้นที่เหมาะสมมากสำหรับปลูกอ้อยและมันสำปะหลัง ดังหน่วยแผนที่ 5 ในตารางที่ 13 หมายถึงเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพมากปลูกได้ทั้งอ้อยและมันสำปะหลัง หน่วยแผนที่สำหรับปลูกพืชได้ 2 ชนิด ได้แก่ หน่วยแผนที่ 5-8 เป็นหน่วยแผนที่ที่เหมาะสมมากสำหรับปลูก อ้อย-มันสำปะหลัง, อ้อย-ยางพารา, มันสำปะหลัง-ยางพารา และ ข้าว-อ้อย คิดเป็นร้อยละ 3.85 0.93 1.51 และ 0.30 ตามลำดับ ส่วนหน่วยแผนที่ดิน 9 และ 10 สามารถปลูกพืชได้ 3 ชนิด ได้แก่ ข้าว-อ้อย-ยางพารา และ อ้อย-มันสำปะหลัง-ยางพารา มีพื้นที่คิดเป็นร้อยละ 0.21 และ 1.87 ตามลำดับ

#### 6.2.2 ไถนึ่งพื้นที่เหมาะสมปานกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีพื้นที่ส่วนใหญ่ในระดับเหมาะสมปานกลาง หรือมีคุณสมบัติทางกายภาพที่เหมาะสมปานกลางต่อการปลูกพืชเศรษฐกิจ ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง และยางพารา คิดเป็นร้อยละ 32.39 ของพื้นที่

ซึ่งสามารถไถนึ่งพื้นที่ได้ทั้งพืชเดี่ยวและหลายชนิด มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

#### 6.2.2.1 ไถนึ่งพื้นที่เหมาะสมปานกลางสำหรับปลูกพืชเดี่ยว

พื้นที่ไถนึ่งนี้มีศักยภาพปานกลางในการปลูกพืชได้ชนิดใดชนิดหนึ่ง ได้แก่ หน่วยแผนที่ 11-14 ดังตารางที่ 13 สำหรับไถนึ่งพื้นที่เหมาะสมปานกลางสำหรับปลูกพืชเดี่ยว ได้แก่ ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง และยางพารา ตามลำดับ มีพื้นที่คิดเป็นร้อยละ 10.23 0.69 6.46 และ 0.87 ตามลำดับ แสดงการกระจายตัวของพื้นที่ที่มีศักยภาพดังภาพที่ 4

#### 6.2.2.2 ไถนึ่งพื้นที่เหมาะสมปานกลางสำหรับปลูกพืชหลายชนิด

หน่วยแผนที่ที่กำหนดพื้นที่ไถนึ่งที่มีศักยภาพปานกลางสำหรับปลูกพืชได้หลากหลายชนิด คือหน่วยแผนที่ 15-19 ดังตารางที่ 13 ซึ่งพื้นที่ใดที่อยู่ในหน่วยแผนที่ 15-18 นั้นสามารถเลือกและผสมผสานการปลูกพืชได้ 2 ชนิด ได้แก่ ข้าว-อ้อย, อ้อย-มันสำปะหลัง, อ้อย-ยางพารา, และ มันสำปะหลัง-ยางพารา มีพื้นที่คิดเป็นร้อยละ 1.18 1.05 6.28 0.86 ตามลำดับ และหน่วยแผนที่ 19 สามารถเลือกและผสมผสานการปลูกพืชได้ 3 ชนิด คือการผสมผสานการใช้ที่ดิน อ้อย-มันสำปะหลัง-ยางพารา มีพื้นที่คิดเป็นร้อยละ 3.78 ของพื้นที่

#### 6.2.3 ไถนึ่งพื้นที่ป่าไม้เพื่อการอนุรักษ์

พื้นที่ไถนึ่งบริเวณนี้เป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ หรือป่าโซน C รวมถึงพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำที่ 1 พื้นที่ลาดชันเชิงซ้อน (พื้นที่ภูเขา) ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ควรสงวนไว้เป็นพื้นที่ป่าไม้ดั้งเดิม เนื่องจากเป็นพื้นที่ลาดชัน มีป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ เป็นพื้นที่ต้นน้ำที่สำคัญหลายสายของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หน่วยแผนที่นี้ ได้แก่ หน่วยแผนที่ 21 มีพื้นที่คิดเป็นร้อยละ 13.11 ของพื้นที่ทั้งหมด

#### 6.2.4 ไถนึ่งพื้นที่ชุมชนและที่อยู่อาศัย

พื้นที่ไถนึ่งบริเวณนี้เป็นพื้นที่ชุมชนและที่อยู่อาศัย กำหนดด้วยหน่วยแผนที่ 22 มีความเหมาะสมต่อการใช้ที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัย หรือสร้างสิ่งปลูกสร้างต่างๆ นอกจากนี้ในเขตพื้นที่นี้ได้มีการกำหนดการใช้ที่ดินไว้ชัดเจนอยู่แล้ว

โดยเฉพาะในเขตเทศบาลเมืองหรือมหานคร แผนการใช้  
ที่ดินนี้จึงคงลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินไว้ตามเดิม

### 6.2.5 โซนนิ่งพื้นที่แหล่งน้ำ


พื้นที่โซนนิ่งบริเวณนี้เป็นพื้นที่แหล่งน้ำที่เป็น  
แหล่งน้ำผิวดิน มีความเหมาะสมต่อการใช้ประโยชน์ในการ

การเกษตร และการอุปโภคบริโภคในชุมชน เช่นเชื่อมขนาด  
ใหญ่ ได้แก่ เชื่อมอุบลรัตน์ เชื่อมสิริธร เชื่อมน้ำอูน เชื่อมลำ  
ตะคอง หรือแหล่งน้ำตามธรรมชาติ ได้แก่บึงหนองหาญ บึง  
โขงหลง เป็นต้น กำหนดเป็นหน่วยแผนที่ 23 ดังตารางที่ 13

ตารางที่ 13 พื้นที่การโซนนิ่งการผสมผสานการใช้ที่ดินตามศักยภาพของพื้นที่

หน่วย แผนที่	ทางเลือกการใช้ที่ดิน	เนื้อที่	
		ไร่	ร้อยละ
1	พื้นที่เหมาะสมมากสำหรับข้าว	6,227,152.92	5.90
2	พื้นที่เหมาะสมมากสำหรับอ้อย	3,267,254.91	3.10
3	พื้นที่เหมาะสมมากสำหรับมันสำปะหลัง	5,315,077.64	5.04
4	พื้นที่เหมาะสมมากสำหรับยางพารา	503,796.07	0.48
5	พื้นที่เหมาะสมมากสำหรับอ้อย-มันสำปะหลัง	4,066,147.93	3.85
6	พื้นที่เหมาะสมมากสำหรับอ้อย-ยางพารา	979,341.72	0.93
7	พื้นที่เหมาะสมมากสำหรับมันสำปะหลัง-ยางพารา	1,589,719.87	1.51
8	พื้นที่เหมาะสมมากสำหรับข้าว-อ้อย	313,638.23	0.30
9	พื้นที่เหมาะสมมากสำหรับข้าว-อ้อย-ยางพารา	223,880.04	0.21
10	พื้นที่เหมาะสมมากสำหรับอ้อย-มันสำปะหลัง-ยางพารา	1,977,483.12	1.87
	<b>รวมพื้นที่เหมาะสมมาก</b>	<b>24,463,492.45</b>	<b>23.18</b>
11	พื้นที่เหมาะสมปานกลางสำหรับข้าว	10,794,270.18	10.23
12	พื้นที่เหมาะสมปานกลางสำหรับอ้อย	728,059.28	0.69
13	พื้นที่เหมาะสมปานกลางสำหรับมันสำปะหลัง	6,814,888.98	6.46
14	พื้นที่เหมาะสมปานกลางสำหรับยางพารา	917,987.79	0.87
15	พื้นที่เหมาะสมปานกลางสำหรับข้าว-อ้อย	1,244,655.82	1.18
16	พื้นที่เหมาะสมปานกลางสำหรับอ้อย-มันสำปะหลัง	2,159,556.33	2.05
17	พื้นที่เหมาะสมปานกลางสำหรับอ้อย-ยางพารา	6,628,905.35	6.28
18	พื้นที่เหมาะสมปานกลางสำหรับมันสำปะหลัง-ยางพารา	903,546.09	0.86
19	พื้นที่เหมาะสมปานกลางสำหรับอ้อย-มันสำปะหลัง-ยางพารา	3,987,770.71	3.78
	<b>รวมพื้นที่เหมาะสมปานกลาง</b>	<b>34,179,640.52</b>	<b>32.39</b>
	<b>รวมพื้นที่เหมาะสมมากและปานกลาง</b>	<b>58,643,132.97</b>	<b>55.58</b>
20	พื้นที่เหมาะสมน้อยและไม่เหมาะสม	28,194,747.38	26.72
21	พื้นที่ป่าอนุรักษ์ (ป่าโซน C) และ/หรือพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำที่ 1(1A, 1B)	13,833,768.83	13.11
22	พื้นที่ชุมชนและอยู่อาศัย	2,681,988.11	2.54
23	พื้นที่แหล่งน้ำ	2,162,200.21	2.05
	<b>รวมพื้นที่ทั้งหมด</b>	<b>105,515,837.5</b>	<b>100.00</b>

# แผนที่โซนนิ่งทางเลือกการใช้ที่ดินเพื่อปลูกพืชเศรษฐกิจ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ



คำอธิบายสัญลักษณ์ หน่วยแผนที่ทางเลือกการใช้ที่ดิน:	ระดับความเหมาะสมปานกลาง	พื้นที่อื่นๆ
<b>ระดับความเหมาะสมมาก</b>	ข้าว	ป่าไม้อนุรักษ์
ข้าว-อ้อย	อ้อย	ที่อยู่อาศัย
อ้อย	มันสำปะหลัง	แหล่งน้ำ
ข้าว-อ้อย-ยางพารา	ยางพารา	พื้นที่เหมาะสมน้อยหรือไม่เหมาะสม
มันสำปะหลัง	ข้าว-อ้อย	สเฟียร์รอยดัด.....WGS 1984
ปลูกอ้อย-มันสำปะหลัง-ยางพารา	อ้อย-มันสำปะหลัง	กริด.....100,000 เมตร UTM เขต 48
ยางพารา	อ้อย-ยางพารา	เส้นโคจรแผนที่.....ทรานส์เวอร์สเมอร์เคเตอร์
อ้อย-มันสำปะหลัง	มันสำปะหลัง-ยางพารา	หลักฐานแนวยืน...คือระดับทะเลปานกลางที่เกาะหลัก
อ้อย-ยางพารา	อ้อย-มันสำปะหลัง-ยางพารา	หลักฐานแนวนอน.....WGS 1984
มันสำปะหลัง-ยางพารา		

ภาพที่ 4 แผนที่โซนนิ่งทางเลือกการใช้ที่ดินเพื่อปลูกพืชเศรษฐกิจ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

### 6.3 การวิเคราะห์ด้านเศรษฐศาสตร์

การวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์สำหรับปลูกพืชเศรษฐกิจข้าวอ้อย มันสำปะหลัง และ ยางพารา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้วยอัตราส่วนต้นทุนกำไร(BC ratio) โดยใช้ข้อมูลพื้นฐานเศรษฐกิจการเกษตร และข้อมูลสถิติการเกษตรของประเทศไทย จากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ปีการผลิต 2541/42 ถึง 2556/57 พบว่าส่วนใหญ่ค่า BC ratio ของการผลิตพืชเศรษฐกิจในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีค่ามากกว่า 1 เพียงเล็กน้อย โดยค่า BC ratio ของการผลิตข้าวในปี 2544/45-2556/57 มีค่าเท่ากับ 1.06 1.31 1.61 1.44 1.28 1.31 1.71 1.26 1.08 0.92 1.04 1.11 และ 1.08 ตามลำดับ BC ratio ของการผลิตอ้อยในปี 2544/45-2556/57 มีค่าเท่ากับ 1.19 0.87 1.16 1.01 1.09 1.23 1.15 0.91 1.04 1.41 1.43 1.41 และ 1.14 ตามลำดับ BC ratio ของการผลิตมันสำปะหลังในปี 2544/45-2556/57 มีค่าเท่ากับ 0.83 1.26 1.21 1.09 1.44 1.53 1.44 1.75 0.97 1.14 1.59 1.21 และ 1.16 ตามลำดับ และ BC ratio ของการผลิตยางพาราในปี 2544/45-

2556/57 มีค่าเท่ากับ 0.91 0.98 1.20 1.43 2.16 2.58 2.55 2.68 1.34 2.33 2.21 1.30 และ 1.08 ตามลำดับ ดังตารางที่ 14

ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ในการผลิตพืชเศรษฐกิจของเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีความแปรปรวนเนื่องจากความเป็นพลวัตรของกลไกทางการตลาด ไม่ว่าจะ เป็น ต้นทุนทางการผลิต ราคาที่เกษตรกรขายได้ หรือ แม้แต่ผลผลิตที่ได้ ล้วนแล้วแต่มีความพลวัตร เช่น หากต้นทุนในการผลิตสูงขึ้น จะทำให้ค่า C มีอัตราสูงซึ่งและส่งผลให้ ค่าความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ลดลง หรือหากผลผลิตขายได้ราคาสูงขึ้น ก็จะส่งผลให้มีความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์มากขึ้น ดังนั้นการวางแผนการใช้ที่ดินเพื่อพืชเศรษฐกิจ จำเป็นต้องมีการนำข้อมูลทางด้านเศรษฐศาสตร์ที่มีความแปรปรวนตลอดเวลามาวิเคราะห์ร่วมกับผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมเชิงพื้นที่เชิงกายภาพด้วย ซึ่งจะทำให้มีข้อมูลสนับสนุน ทางเลือกการใช้ที่ดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

**ตารางที่ 14** B/C Ratio ของการผลิตพืชเศรษฐกิจ ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง และยางพารา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการเพาะปลูก 2541/42 – 2556/57

ปีการเพาะปลูก	อัตราส่วนต้นทุนกำไร (B/C Ratio)			
	ข้าว	อ้อย	มันสำปะหลัง	ยางพารา
2541/42	1.23	1.11	1.59	0.76
2542/43	1.30	1.06	1.05	0.76
2543/44	1.21	1.17	0.81	0.99
2544/45	1.06	1.19	0.83	0.91
2545/46	1.31	0.87	1.26	0.98
2546/47	1.61	1.16	1.21	1.20
2547/48	1.44	1.01	1.09	1.43
2548/49	1.28	1.09	1.44	2.16
2549/50	1.31	1.23	1.53	2.58
2550/51	1.71	1.15	1.44	2.55
2551/52	1.26	0.91	1.75	2.68
2552/53	1.08	1.04	0.97	1.34
2553/54	0.92	1.41	1.14	2.33
2554/55	1.04	1.43	1.59	2.21
2555/56	1.11	1.41	1.21	1.30
2556/57	1.08	1.14	1.16	1.08



## 7. สรุปผลและข้อเสนอแนะ

การศึกษาครั้งนี้ได้สร้างข้อมูลภูมิสารสนเทศในการทำโซนนิ่งพื้นที่การเกษตรเชิงพื้นที่ด้วยการสร้างขอบเขตหน่วยการใช้ที่ดินที่เหมาะสมสำหรับการผสมผสานทางเลือกการใช้ที่ดิน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากการบูรณาการคุณภาพที่ดินตามหลักการประเมินที่ดินของ FAO (1983) เพื่อประเมินความเหมาะสมของที่ดินสำหรับปลูกพืชเศรษฐกิจ ได้แก่ ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง และยางพารา จากนั้นบูรณาการข้อมูลความเหมาะสมของที่ดินสำหรับพืชแต่ละชนิดมาบูรณาการแบบซ้อนทับ และคัดเลือกเฉพาะบริเวณที่มีความเหมาะสมมากและปานกลาง เพื่อสร้างข้อมูลภูมิสารสนเทศสนับสนุนการจัดทำแผนที่โซนนิ่งพื้นที่การเกษตรสำหรับการผสมผสานทางเลือกการใช้ที่ดิน

ผลการศึกษสามารถประเมินพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับปลูกพืชเศรษฐกิจ 4 ชนิด ได้แก่ ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง และยางพารา โดยจำแนกระดับความเหมาะสมออกเป็นเหมาะสมมาก เหมาะสมปานกลาง เหมาะสมน้อย และไม่เหมาะสม พบว่าพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับปลูกข้าว มีพื้นที่เหมาะสมมากและปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 6.86 และ 14.80 ของพื้นที่ ตามลำดับ พื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับปลูกอ้อยมีพื้นที่เหมาะสมมากและปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 10.26 และ 18.00 ของพื้นที่ ตามลำดับ พื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับปลูกมันสำปะหลังมีพื้นที่เหมาะสมมากและปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 18.19 และ 16.69 ของพื้นที่ ตามลำดับ พื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับปลูกยางพารามีพื้นที่เหมาะสมมากและปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 5.28 และ 16.70 ของพื้นที่ตามลำดับ

การบูรณาการข้อมูลความเหมาะสมของที่ดินสำหรับพืชแต่ละชนิด โดยการคัดเลือกเฉพาะพื้นที่ที่เหมาะสมมากและเหมาะสมปานกลาง นำมาสร้างเป็นแผนที่โซนนิ่งพื้นที่การเกษตรสำหรับการผสมผสานทางเลือกการใช้ที่ดิน ผลการบูรณาการสามารถสร้างหน่วยแผนที่ได้ทั้งสิ้น 23 หน่วยแผนที่ โดยมีความยืดหยุ่นให้เกษตรกรสามารถเลือกปลูกพืชและผสมผสานการใช้ที่ดินได้หลายชนิด การกำหนดหน่วยแผนที่และโซนนิ่งแบ่งออกเป็น 5 โซนนิ่งหลัก ได้แก่ โซนนิ่งพื้นที่ที่เหมาะสมมากสำหรับปลูกพืชเศรษฐกิจ โซนนิ่ง

พื้นที่เหมาะสมปานกลางสำหรับปลูกพืชเศรษฐกิจ โซนนิ่งพื้นที่ป่าไม้เพื่อการอนุรักษ์ โซนนิ่งพื้นที่ชุมชนและที่อยู่อาศัย และโซนนิ่งพื้นที่แหล่งน้ำ มีเนื้อที่คิดเป็นร้อยละ 23.18 32.39 26.72 13.11 2.54 และ 2.05 ของพื้นที่ทั้งภาค ตามลำดับ

เพื่อให้ผลการวิเคราะห์สามารถนำไปใช้ได้จริงมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในขั้นตอนการประเมินค่าที่ดินควรมีวิธีการประมาณผลผลิตที่ได้ในแต่ละระดับความเหมาะสมและในแต่ละพืช ซึ่งเป็นแผนการดำเนินการวิจัยต่อไปในอนาคต

## เอกสารอ้างอิง

กรมพัฒนาที่ดิน. (2539). เอกสารวิชาการ คู่มือการ

**ประเมินคุณภาพที่ดินสำหรับพืชเศรษฐกิจ.**

พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: กองวางแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

ชรัตรี มงคลสวัสดิ์. (2549). **ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ**

**ศักยภาพเชิงพื้นที่เพื่อการพัฒนา.** ขอนแก่น:

ขอนแก่นการพิมพ์.

ชรัตรี มงคลสวัสดิ์, วาสนา พุฒกลาง และ แสงดาว นพพิทักษ์. (2552ก). พื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับปลูกข้าว

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. **การประชุมวิชาการ**

**ดาวเทียมออสเทคโนโลยีอวกาศของไทยเพื่อ**

**การพัฒนาภูมิสารสนเทศ วันที่ 8-9 กันยายน**

2552, โรงแรมภูศุลา พลาซ่าไฮเต็ล แอนด์ สปา

อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี หน้าที่ 81-101.

ชรัตรี มงคลสวัสดิ์, วาสนา พุฒกลาง, แสงดาว นพพิทักษ์

และ อุรวรรณ จันทร์เกษ. (2552ข). พื้นที่

เหมาะสมสำหรับปลูกอ้อยภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ. **การประชุมวิชาการ**

**ดาวเทียมออสเทคโนโลยีอวกาศของไทยเพื่อ**

**การพัฒนาภูมิสารสนเทศ วันที่ 8-9 กันยายน**

2552, โรงแรมภูศุลา พลาซ่าไฮเต็ล แอนด์ สปา

อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี หน้าที่ 170-188.

- ชรัตน์ มงคลสวัสดิ์ และ วาสนา พุฒกลาง. (2553). การ  
ประกอบแบบจำลองเชิงพื้นที่สำหรับประเมินความ  
เหมาะสมของที่ดินสำหรับปลูกยางพารา ในภาค  
ตะวันออกเฉียงเหนือ. **การประชุมวิชาการ  
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ  
ประจำปี 2553 วันที่ 15-17 ธันวาคม 2553**, อิม  
แพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
- วาสนา พุฒกลาง และ ชรัตน์ มงคลสวัสดิ์. (2553). ความ  
เหมาะสมของที่ดินและการประเมินพื้นที่ปลูกมัน  
สำปะหลังด้วยข้อมูล ภาพถ่ายจากดาวเทียมและ  
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์. **วารสารสมาคม  
สำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศ  
ภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย**, 11(1) หน้าที่ 67-89.
- สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร. (2541-2556). **สถิติ  
การเกษตรของประเทศไทย ปี 2541-2555**.  
ศูนย์สารสนเทศการเกษตร: สำนักงานเศรษฐกิจ  
การเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.
- สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร. (2541-2556). **ข้อมูล  
พื้นฐานเศรษฐกิจการเกษตร ปี 2541-2555**.  
ศูนย์สารสนเทศการเกษตร: สำนักงานเศรษฐกิจ  
การเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.
- Abdelfattah, M.A. (2013). Integrated Suitability  
Assessment: A Way Forward for Land Use  
Planning and Sustainable Development in  
Abu Dhabi, United Arab Emirates, **Arid Land  
Research and Management**, 27(1), pp.41-64.
- Amiri, F., Rashid B., A., and Shariff, M. (2012).  
Application of geographic information  
systems in land use suitability evaluation for  
beekeeping: A case study of Vahregan  
watershed (Iran). **African Journal of  
Agricultural Research**, 7(1), pp. 89-97.
- Akinci, H., Özalp, A.Y., Turgut, B. (2013). Agricultural  
land use suitability analysis using GIS and  
AHP technique, **Computers and Electronics in  
Agriculture**, 97, pp.71-82.
- Boix, L.R., and Zinck, J.A. (2008). Land-Use  
Planning in the Chaco Plain (Burruyacu',  
Argentina). Part 1: Evaluating Land-Use  
Options to Support Crop Diversification in an  
Agricultural Frontier Area Using Physical Land  
Evaluation. **Environmental Management**, 42,  
pp. 1043–1063.
- Benjaporn, H., Suwanwerakamtorn, R. and  
Mongkolsawat, C. (2012). Agricultural Land  
Use Planning With GIS-based Land Suitability  
for Crop Combination. **Proceedings of the 3rd  
International Conference on Environmental and  
Rural Development: 21-12 January 2012**,  
Khon Kaen, Thailand.
- Boardman, A.E., Greenberg, D.H., Vining, A.R., &  
Weimer, D.L. (1996). **Cost-Benefit Analysis:  
Concepts and Practice**. New Jersey, USA:  
Prentice-Hall.
- Boateng, E. (2005) Geographic Information System  
(GIS) as a Decision Support Tool for Land  
Suitability Assessment for Rice Production in  
Ghana. **West African Journal of Applied  
Ecology**, 7, pp. 69-81.
- Ceballos-Silva, A. & López-Blanco, J. (2003).  
Delineation of suitable areas for crops using a  
Multi-Criteria Evaluation approach and land  
use/cover mapping: a case study in Central  
Mexico, **Agricultural Systems**, 77, pp.117-136.
- Charaupatt T. and Mongkolsawat C. (2003). Land  
Evaluation for Economic crops of Lam Phra  
Phloeng Watershed in Thailand using GIS  
Modeling. **Asian Journal of Geoinformatics**, 3  
(3), pp 89-98.

- De La Rosa, D., Mayol, F., Diaz-Pereira, E., Fernandez, M., and De La Rosa Jr., D. (2004). A land evaluation decision support system (MicroLEIS DSS) for agricultural soil protection with special reference to the Mediterranean region, *Environmental Modelling & Software*, **19**, pp. 929-942.
- Elsheikh, R., Mohamed Shariff, A.R.B., Amiri, F., Ahmad, N.B., Balasundram, S.K., and Soom, M.A.M. (2013). Agriculture Land Suitability Evaluator (ALSE): A decision and planning support tool for tropical and subtropical crops, *Computers and Electronics in Agriculture*, **93**, pp. 98-110.
- FAO. (1983). *Guidelines: Land Evaluation for Rainfed Agriculture*. Soils Bulletin No.52. Rome, Italy: Food and Agriculture Organization of the United Nations.
- Hoobler, B. M., Vance, G. F., Hamerlinck, J. D., Munn, L. C., and Hayward, J. A. (2003). Applications of land evaluation and site assessment (LESA) and a geographic information system (GIS) in East Park County, Wyoming. *Journal of Soil and Water Conservation*, **58**, pp. 105-112.
- Martin, D., & Saha, S.K. (2009). Land evaluation by integrating remote sensing and GIS for cropping system analysis in a watershed. *Current Science*, **96**(4), pp. 569-575.
- Mokarram, M, Marnani, S.A., Moezi, A.A., Hamzeh, S. (2011). Land suitability evaluation using ordered weight averaging with fuzzy quantifier in Shavoor plain, Iran, *Research on Crops*, **12**(2), pp. 593-599.
- Mongkolsawat C., Thirangoon P. and Kuptawuthinan P. (1999). Land Evaluation for Combining Economic Crops using GIS and Remotely Sensed Data. *Proceedings of the 2<sup>nd</sup> Asia Pacific Conference on Sustainable Agriculture*, Pitsanulok, October 18-20, 1999.
- Mongkolsawat C, Paiboonsak S. (2006a). GIS-based Land Evaluation for Combining Economic Crop as a model for Agricultural Land Use Planning. *Proceedings of the 27<sup>th</sup> Asian Conference on Remote Sensing of Mongolia*, October 5-16, 2006.
- Mongkolsawat C, Paiboonsak S. (2006b). GIS Application to Spatial Distribution of Soil Salinity Potential in Northeast THAILAND. *Proceedings of the 27<sup>th</sup> Asian Conference on Remote Sensing of Mongolia*, October 5-16, 2006.
- Mongkolsawat C., Paiboonsak S., Chanket U. (2006c). Soil Erosion Risk Northeast Thailand: A Spatial Modeling. *Proceedings of the International Conference on Space Technology & Geo-informatics 2006 in Conjunction with National Conference on Mapping and Geo-informatics 2006*, 5-8 November 2006, Ambassador City Jomtien Hotel, Chonburi Province, Thailand.
- Mongkolsawat, C & Putklang, W. (2012). Rubber tree expansion in forest Reserve and paddy field across the Greater Mekong sub-region, Northeast Thailand based on remotely sensed imagery. *Proceedings of the 33<sup>rd</sup> Asian Conference on Remote Sensing Thailand*, 26-30 November 2012, Pattaya, Thailand.

Paiboonsak S. and Mongkolsawat C. (2004).

Agricultural Land Use Planning in Khon Kaen Province. GIS Application. **Proceedings of the 25<sup>th</sup> Asian Conference on Remote Sensing, Chiangmai, Thailand, November 22 - 25, 2004**

Radcliffe, D. J., & Rochette, L. (1982). **Maize in**

**Angonia: An analysis of factors production.**

(Field Report 30): Rome, Italy: Maputo.

Wischmeier, W.H. and Smith, D.D. (1978). **Predicting**

**Rainfall Erosion Losses.** USDA Agriculture

Handbook No.537.